

027043 特発性顔面神経麻痺 (bell麻痺)

ステップ名称	ステップ1	ステップ2		ステップ3	
	1日目	2日目~4日目	5日目~7日目	8日目	9日目
到達目標	入院中の治療について理解できる	心身ともに安定した状態で治療が行える		日常生活の注意点を理解し退院できる	
処置		朝食前に血糖を測ります	朝食前に血糖を測ります	朝食前に血糖を測ります	朝食前に血糖を測ります
検査			5日目採血があります	血液検査があります	10時ごろに退院です
体温・呼吸・循環	入院時に体重測定をします	 10時 19時ごろに体温、脈拍などを測ります	 10時 19時ごろに体温、脈拍などを測ります	 10時 19時ごろに体温、脈拍などを測ります	
	 入院時に体温、脈拍などを測ります		5日目体重測定をします		
注射	入院後点滴があります 終了後に点滴を抜きます	9時ごろから点滴があります	9時ごろから点滴があります	9時ごろから点滴があります	
投薬	 朝食、夕食後に内服薬があります	 朝食、夕食後に内服薬があります	 朝食、夕食後に内服薬があります	 朝食、夕食後に内服薬があります	 退院後の薬を渡します
	持参薬があればお知らせください				
清潔・排泄	制限はありません				退院後、制限はありません
食事	制限はありません				退院後、制限はありません 糖尿病の場合、退院後も食事に注意します
活動・安静度	制限はありません		5日目医師の許可により外出できます		退院後、しばらくは無理をしないでください
教育・指導・説明・リハビリ	 主治医から治療について説明があります			薬剤師から薬について説明があります	 主治医から退院説明があります
	薬剤師から薬について説明があります				 看護師から日常生活や次回受診日について説明があります
	 看護師から入院生活について説明があります				退院後、顔面マッサージを継続します
	特別な栄養管理の必要性 (有)				
書類	入院診療計画書を渡します				退院療養計画書、請求書を渡します
手術					