

## 眼瞼内反症

ステップ名称	ステップ1		ステップ2	ステップ3	
	基準日			1日後	2日後
	術前	術中	術後		
到達目標	手術に対する心身の準備ができる		安全に手術が終了する	日常生活の注意点を理解し退院できる	
処置	手術側にマークをつけます		創部は術後48時間保冷剤やアイスノンなどで冷やします	創部は術後48時間保冷剤やアイスノンなどで冷やします	創部は術後48時間保冷剤やアイスノンなどで冷やします
				ガーゼ交換があります	8:45形成外来にてガーゼ交換があります
				9・14・19時ごろ点眼があります	10時ごろ退院です
				21時ごろ眼軟膏があります	
検査					
体温・呼吸・循環	 手術室に行く前に体温・脈拍などを測ります		 帰室直後 適宜 体温、脈拍などを測ります	 10時 14時ごろに体温、脈拍などを測ります	
注射					
投薬	持参薬があればお知らせください				
				朝から指示の持参薬を服用します	
清潔・排泄					退院後、首から下のシャワーができます 退院翌日から、洗顔・シャンプーができます
食事	昼食は半分量の食事になります		帰室後から飲水できます 夕から普通食です		退院後、制限はありません
活動・安静度	歩いて手術室へ行きます		車椅子で病室に帰ります		自宅では安静にします 運動は控えてください
			手術後、初回のトイレ歩行は看護師と共に歩きます トイレ以外ベッド上で安静にします うつまかないとよにします		
教育・指導・説明・リハビリ	 看護師から入院生活、手術について説明があります		 主治医から術後説明があります	 点眼と眼軟膏をいれる方法について説明があります	 点眼と眼軟膏をいれる方法について説明があります
	特別な栄養管理の必要性（有）		薬剤師からお薬について説明があります		看護師から日常生活や次回受診日について説明があります
書類	入院診療計画書を渡します				手術後1週間頃に形成外科外来で抜糸します
	手術同意書を提出してください				退院療養計画書を渡します
手術					

※日数は2日～3日と異なる場合があります。